

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第一類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ペレウス
2	成分・分量	100g中 メチルテストステロン 0.5g
3	用法・用量	1日1～2回適量を患部に塗布してください。 【用法・用量に関する注意】 (1) 目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合は眼科医の診療を受けてください。 (2) 内服しないでください。 (3) 本剤の有効成分メチルテストステロンは男性ホルモンのため、頭皮には使用しないでください。
4	効能・効果	眉毛脱毛、脇窩無毛、恥部無毛、薄毛（まゆ毛・体毛の発毛促進に）
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は使用しないこと (1) 本剤又は本剤の成分に対しアレルギー症状を起こしたことがある人 (2) ご使用前に本剤を適量出し、内股などの皮ふのうすい所にすり込んで、翌日中に薬疹、発赤、かゆみ、かぶれ、はれなどの症状が現れた人 (3) 15歳未満の小児 (4) 妊婦、妊娠している可能性がある女性、授乳中の人 (5) アンドロゲン依存性腫瘍（例えば前立腺腫瘍、乳腫瘍（悪性））及びその疑いのある人 (6) 排尿困難を伴う前立腺肥大のある人 (7) 前立腺検査※の結果、前立腺特異抗原（PSA）の値が2.0ng/mL以上の人（医師の判断に従うこと） *本剤の有効成分（メチルテストステロン）は前立腺腫瘍を進行させるおそれがあります。 (a) 特に50歳以上の男性は前立腺腫瘍の罹患率が高まるため、本剤のご使用前に前立腺検査を受ける必要があります。 (b) 継続的にご使用の人は定期的な検査を受ける必要があります。 (c) 検査の結果、異常があった場合には直ちに本剤のご使用を中止して、医師又は薬剤師に相談してください。 (8) 睡眠時無呼吸症候群である人 (9) 円形脱毛症の人 2. 次の部位には使用しないこと ①目や目の周囲、粘膜（口腔、鼻腔等）、②頭髪、まつ毛、③陰茎部先端（尿道口）、恥部の粘膜部、④外傷、炎症、湿疹、ただれ、化膿などのある部位 3. 本剤を使用している間は、男性ホルモンを含んだいずれの医薬品も使用しないこと 4. 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談すること ①医師の治療を受けている人、②前立腺肥大症ではあるが、排尿困難を伴わない人、③本人又は家族が、薬や化粧品などによるアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ等）を起こしたことがある人、④重度の心臓病、腎臓病、肝臓病、高血圧又はその既往歴のある人、⑤次の症状があらわれた場合：(a) 恥部、脇窩（ワキの下）、眉に、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等、(b) 月経異常又は男性化の兆候
6	薬剤師が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。