

MEDICARE®

メテイクアシリーズ

【販売名】

口内炎・口角炎 デンタルクリーム

●口内炎とは…

口の粘膜のできる小さな潰瘍(粘膜表面の細胞が壊れてできる穴)で、死んだ細胞などのために、見た目は白っぽく見えます。また、患部は痛くてしみるので、食事や会話など日常生活でも支障をきたすことが多いです。

●口内炎の原因は…

口の粘膜を噛んだり、傷つけてしまったり、ストレスや疲れ・睡眠不足、ドライマウスなどがあります。

●口内炎を予防するには…

栄養バランスのとれた食事や規則正しい生活の他、口の中の乾燥を防いだり、うがい・歯磨きなどによって口の中を清潔に保つことなども重要です。

●デンタルクリームは

局所麻酔成分(ジブカイン塩酸塩、アミノ安息香酸エチル)が痛みに直接働きかけ、殺菌成分(塩化セチルピリジニウム)が原因菌を殺菌し、消炎成分(*l*-メントール)が患部の炎症をやわらげる軟膏タイプの医薬品です。口腔内の痛みを鎮め、殺菌し、口内炎・口角炎を効果的に治療します。

⚠️使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は使用しないでください。

メトヘモグロビン血症の診断を受けた人



相談すること

- 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師又は歯科医師の治療を受けている人
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- しばらく使用しても症状がよくなる場合も使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効果・効能

口内炎、口角炎、虫歯、歯根炎、歯肉炎等による歯痛、歯槽膿漏

用法・用量

1日数回、適量を清潔な指先、または脱脂綿につけて、患部に塗擦してください。虫歯には、そのくぼみ並びに歯肉に塗布してください。

【用法・用量に関連する注意】


(1)定められた用法・用量を守ってください。(2)小児に使用される場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3)本剤は効果・効能に記載されている症状にのみ使用し、眼科用その他に使用しないでください。(4)局所麻酔成分が入っているため、製剤が付着した部位にしびれを感じる場合があります。

【上手な使い方】

(1)清潔なティッシュペーパーやガーゼなどを患部の唾液に軽く押し当ててふきとる。(2)清潔な指先、または脱脂綿に軟膏をとり、患部にうすくのばす。

【チューブの穴の開け方】

キャップを逆さにして、突起部をチューブの先に強く押し当ててください。



(100g中)

成分・分量

成分	含量	はたらき
ジブカイン塩酸塩	1.0g	局所麻酔作用により、口内炎・口角炎の痛みを鎮めます。
アミノ安息香酸エチル	0.3g	
塩化セチルピリジニウム	0.1g	殺菌作用により、口腔粘膜の化膿を防ぎます。
ℓ-メントール	0.1g	患部の炎症をやわらげます。

添加物として、ポリソルベート80、ポビドン、ゲル化炭化水素、香料を含有します。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手のとどかない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

本品のお問い合わせは、お買い求めのお店、または次のところにお問い合わせください。

森下仁丹株式会社(お問合せ先) ☎0120-181-109
受付時間 平日9:00~21:00(土、日、祝日9:00~17:00)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 ☎0120-149-931
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

発売元

森下仁丹株式会社

大阪市中央区玉造1丁目2番40号

製造

万協製薬株式会社

販売元

三重県多気郡多気町五桂1169-142

MKM980-⑤HG