

第1類医薬品


MEDICARE

メディケアシリーズ

ご使用前に必ずこの添付文書をお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

眉毛を育てる医薬品 Pereus 【販売名】ペレウス

眉毛の発毛促進のメカニズム



- ・眉毛の発毛に有効な成分であるメチルテストステロンが毛母細胞に働きかけ、発毛を促進させます。
- ・使いやすいノック式極細ペンタイプ
- ・無色透明で、べとつかず、さらりとした液剤です。

頭髪へはご使用できません。

△使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故がおこりやすくなる)

- 次の人は使用しないでください。
 - 本剤又は本剤の成分に対しアレルギー症状を起こしたことがある人
 - ご使用前に本剤を適量出し、内股などの皮膚のうすい所にすり込んで、翌日中に薬疹、発赤、かゆみ、かぶれ、はれなどの症状が現れた人
 - 15歳未満の小児
 - 妊婦、妊娠している可能性のある女性、授乳中の人
 - アンドロゲン依存性腫瘍(例えば前立腺腫瘍、乳腫瘍(悪性))及びその疑いのある人
 - 排尿困難を伴う前立腺肥大のある人
 - 前立腺検査※の結果、前立腺特異抗原(PSA)の値が2.0ng/mL以上の人(医師の判断に従うこと)
※本剤の有効成分(メチルテストステロン)は前立腺腫瘍を進行させるおそれがあります。
 - 特に50歳以上の男性は前立腺腫瘍の罹患率が高まるため、本剤のご使用前に前立腺検査を受ける必要があります。
 - 継続的にご使用の人は定期的な検査を受ける必要があります。
 - 検査の結果、異常があった場合には直ちに本剤のご使用を中止して、医師又は薬剤師に相談してください。
 - 睡眠時無呼吸症候群である人
 - 円形脱毛症の人
- 次の部位には使用しないでください。
 - 目や目の周囲、粘膜(口腔、鼻腔等)
 - 頭髪、まつ毛
 - 陰茎部先端(尿道口)、恥部の粘膜部
 - 外傷、炎症、湿疹、ただれ、化膿などのある部位
- 本剤を使用している間は、男性ホルモンを含んだいずれの医薬品も使用しないでください。
- 使用者以外へ付着させないでください。
 - ご使用後は石鹸とぬるま湯で手を十分に洗ってください。
 - 本剤を使用者以外の人に付着させないように注意してください。付着した場合は直ちに洗い流してください。
 - 塗布部が他の人と接触する可能性があるときは、塗布部を石鹸とぬるま湯で十分に洗い流してください。

裏面もお読みください

相談すること

- 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 前立腺肥大症ではあるが、排尿困難を伴わない人
 - 本人又は家族が、薬や化粧品などによるアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ等)を起こしたことがある人
 - 重度の心臓病、腎臓病、肝臓病、高血圧又はその既往歴のある人
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
恥部、腋窩(ワキの下)、眉	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等
 - 月経異常又は、男性化の兆候があらわれた場合
- 1~3ヵ月使用しても症状の改善がみられない場合は使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
- 誤った使い方をしてしまった場合、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

効能・効果

眉毛脱毛、腋窩無毛、恥部無毛、薄毛
(眉毛・体毛の発毛促進に)


用法・用量

1日1、2回適量を患部に塗布してください。

*ご使用前に、容器後部のボタンを音がするまで押し、薬液をペン先に浸透させてください。

使用例

目に入らないように
ガーゼやコットンな
どで目をおさえてく
ださい。



【用法・用量に関する注意】

- 目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合は眼科医の診療を受けてください。
- 内服しないでください。
- 本剤の有効成分メチルテストステロンは男性ホルモンのため、頭皮には使用しないでください。

成分・分量

(100g中)

成分	含量	はたらき
メチルテストステロン	0.5g	毛母細胞に働きかけ、眉毛の発毛を促進します。

添加物としてグリセリン、エタノール、コレステロール、香料を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 直射日光の当たらない、なるべく涼しいところに密栓をして保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります)
- 火気に近づけないでください。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

火気厳禁：アルコール類 危険等級Ⅱ(エタノール)

本品のお問い合わせは、お買い求めのお店、または次のところにお問い合わせください。
森下仁丹株式会社(お問合せ先) ☎0120-181-109
受付時間 平日9:00~21:00(土、日、祝日9:00~17:00)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構 ☎0120-149-931
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

発売元 **森下仁丹株式会社**
大阪市中央区玉造1-2-40

製造 **協和新薬株式会社**
販売元 埼玉県草加市小山1-28-8
MPR2500R-①GE